

Fièvre Aphteuse



Maladie	Bactérienne <input type="checkbox"/>	Virale <input checked="" type="checkbox"/>	Parasitaire <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Principales espèces animales touchées	Tous les bi-ongulés sauvages et domestiques (bovins, ovins, caprins, suidés, cervidés ...)			
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Résistant dans le milieu extérieur		
	Au froid :	Résistant à la congélation		
	Au chaud :	Sensible à la cuisson		
	Aux agents chimiques :	Sensible à la soude à 8%, à la chaux		

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	Mortelle pour les jeunes
Symptômes	Aphtes au niveau de la bouche, du nez, de la mamelle et des pieds, salivation, boiterie
Organes atteints	Bouche, pied, mamelle, cœur
Causes de la maladie	Virus de la famille des <i>Picornaviridae</i> , genre <i>Aphtovirus</i> Extrêmement contagieux, toutes les excréments sont contaminantes
Période(s) critique(s)	Toute l'année
Voies de contamination	Contact direct entre 2 animaux : par la salive contaminée, l'air expiré Contact indirect : virus sur matériel (inhalation, léchage)
Prévention	Lorsqu'un foyer surgit, tout est mis en oeuvre pour éviter la diffusion. La chasse peut être interdite dans la zone atteinte.

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Voies de contamination	Inhalation d'air contaminé ou léchage de matériel contaminé
	Espèces sensibles	Bovins, ovins, caprins, porcins : chute de la lactation, avortements
Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect <input checked="" type="checkbox"/>	Prévention	En cas de suspicion sur la faune sauvage, rentrer les bêtes
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Dangerosité	-
	Prévention	-

CHEZ L'HOMME RISQUE DE TRANSMISSION** : +		
Gravité de la maladie	Contamination rare mais possible.	
Symptômes	Petite fièvre avec aphtes buccaux et vésicules entre les doigts.	
Organes atteints	Bouche et doigts.	
Causes de la maladie	Virus de la famille des <i>Picornaviridae</i> , genre <i>Aphtovirus</i> Contamination par une plaie lors d'un contact avec animal malade ou par l'alimentation (lait)	
Période(s) critique(s)	Toute l'année	
Voies de contamination	Peau saine <input type="checkbox"/>	Alimentation <input checked="" type="checkbox"/>
	Peau blessée <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalation <input type="checkbox"/>
	Muqueuses <input type="checkbox"/>	Piqûre d'insecte <input type="checkbox"/>
Prévention	Dans une zone contaminée être très prudent en manipulant le gibier chassé. Porter des gants pour éviscérer. Désinfecter aussitôt les plaies.	
Traitement	-	
Maladie professionnelle	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	

**Importance du risque de transmission : + à +++